

FACE AUX FAITS

2020

Incluant les points saillants des statistiques annuelles du Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes 2019ⁱ

Insuffisance rénale

- Un Canadien sur dix est atteint d'insuffisance rénale ce qui représente **4 millions de personnes**.ⁱⁱ
- La principale cause de l'insuffisance rénale terminale est le **diabète** (38 %).^{*}
- Le nombre de personnes aux prises avec l'insuffisance rénale terminale a **grimpé de 35 %** depuis 2009.^{*}
- 46 % des nouveaux patients atteints ont **moins de 65 ans**.^{*}
- Plus de **50 000 Canadiens** reçoivent des traitements pour l'insuffisance rénale terminale.ⁱⁱⁱ
- Traitement pour les personnes au stade de l'insuffisance rénale terminale :
 - 58 % sont en **dialyse**;
 - 42 % sont porteurs d'un **greffon fonctionnel**.ⁱⁱⁱ
- Pour les patients en dialyse, **plus des trois quarts** sont en hémodialyse dans un établissement de santé, ce qui est l'option de traitement la plus coûteuse.ⁱⁱⁱ
- On peut perdre plus de **50 % de sa fonction rénale** avant que les symptômes apparaissent. Dans les premiers stades, il n'y a pas de symptôme apparent.
- Il n'existe **aucun traitement curatif** pour l'insuffisance rénale terminale.
- En 2018, l'insuffisance rénale était la 10^e cause de décès au Canada.^{iv}
- Plus de 25 % des patients au Canada étaient des **orientations tardives**; on entend par là que leur dialyse a débuté dans les 90 jours suivant la première consultation chez un néphrologue.^{*}

Don d'organes

- **75 %** des quelque 4 300 Canadiens en attente d'une transplantation d'organe ont **besoin d'un rein**.^v
- Seulement **11 %** des personnes en dialyse **sont sur une liste d'attente** pour une transplantation.^{iii et v}
- Le taux de survie après cinq ans chez les adultes ayant reçu un greffon rénal est de **88 %** dans le cas d'un rein provenant d'un donneur vivant et de **81 %** si le rein provient d'un donneur décédé.^{*}
- En 2018, **1 709 transplantations rénales ont été effectuées**.^v
- Le temps d'attente médian pour une transplantation dans le cas d'un rein provenant d'un donneur décédé est de **3 ans et 10 mois**.^{*}
- Le temps d'attente médian en 2018 était :
 - le plus long au **Manitoba** (6 ans et 3 mois)
 - le plus court en **Colombie-Britannique et Yukon** (3 ans et 1 mois)^{*}
- 28 % des transplantations rénales sont rendues possibles grâce à des **donneurs vivants**.^v
- Plus de 50 % des donneurs vivants ne sont **pas apparentés** au receveur.^v
- Par million d'habitants, seulement **21 personnes ont fait don de leurs organes** et **15 furent des donneurs vivants**.
- Les taux de transplantations rénales en provenance de donneurs décédés par million d'habitants :
 - Taux le plus élevé : **Colombie-Britannique et Yukon** 24,2
 - Taux le plus bas : **Saskatchewan**: 13,8
- Depuis 2008, le Programme de don croisé de rein a permis la réalisation de **721 transplantations**.^{iv}

Passez à l'action :

1. Indiquez votre intention de faire don de vos organes sur votre carte d'assurance-santé, sur votre permis de conduire ou en vous inscrivant dans le registre des donneurs de votre province.
2. Parlez-en à votre famille et à vos proches afin qu'ils soient au courant de vos intentions.
3. Pensez à la possibilité de devenir un donneur vivant.
4. Pour vous inscrire dans le registre du Programme de don croisé de rein, allez au : sang.ca/fr/organes-et-tissus.
5. Familiarisez-vous avec vos propres risques d'être atteint d'insuffisance et apprenez comment prévenir l'insuffisance rénale terminale. Visitez rein.ca/risque.

Incluant les points saillants des statistiques annuelles du Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes 2019ⁱ

Fardeau et coûts des soins

L'insuffisance rénale et le traitement qu'elle exige **affectent lourdement**, sur le plan physique et psychologique, **la vie du patient**.

Les patients aux prises avec l'insuffisance rénale terminale doivent suivre un traitement d'hémodialyse **trois fois par semaine**, d'une durée de **quatre à cinq heures** chacun. Le transport à destination et en provenance de l'établissement qui le dispense peut poser des difficultés, notamment d'ordre financier.


La dialyse est le traitement le plus courant pour l'insuffisance rénale terminale et elle coûte **près de 100 000 \$ par patient par année** au système de santé.ⁱⁱ

Pour ce qui concerne l'insuffisance rénale chronique, il en coûte approximativement au système de santé **40 milliards de dollars par année**.ⁱⁱ

Investissements dans la recherche

La Fondation du rein s'emploie à promouvoir l'excellence dans la recherche par le biais de ses programmes de subventions. Depuis 1964, la Fondation a versé **au-delà de 127 millions de dollars** à la recherche.

Portrait chiffré de la recherche en 2019 : 4 027 818 \$



- i) Transplantations d'organes au Canada : statistiques annuelles du RCITO, 2019, <https://www.cihi.ca/fr/transplantations-dorganes-au-canada-statistiques-annuelles-du-rcito-2019>
- ii) Manns, Braden et al. "The Financial Impact of Advanced Kidney Disease on Canada Pension Plan and Private Disability Insurance Costs" *Canadian journal of kidney health and disease* vol. 4 2054358117703986. 17 Apr. 2017, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406196/>
- iii) Transplantations d'organes au Canada : statistiques annuelles du RCITO, 2019, <https://www.cihi.ca/fr/transplantations-dorganes-au-canada-statistiques-annuelles-du-rcito-2019>, le tout complété par des données colligées par la Division du Québec de La Fondation canadienne du rein tels que fournis par les unités de soins rénaux
- iv) Statistique Canada. <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310039401>
- v) Rapport électronique sur les statistiques relatives aux transplantations, aux listes d'attente et aux donneurs 2018 du RCITO, <http://www.cihi.ca/sites/default/files/document/corr-estimates-2018-fr-web.xlsx>
- vi) Société Canadienne du sang, Programme de don croisé de rein (DCR), <https://professionaleducation.blood.ca/fr/organes-et-tissus/programmes-et-services/programme-de-don-croise-de-rein-dcr>